ЦИТОМЕД
NeutraSkin Aqua

Кожа перестает вспыхивать. Краснота теряет повод.

Действует против нейрогенного и иммуногенного воспаления

Косметическая композиция, основанная на сочетании двух пептидов: Palmitoyl tripeptide-8 и Nicotinoyl tetrapeptide-7, предотвращает воспаление, снимает раздражение и восстанавливает барьерные функции кожи, действуя против нейрогенного и иммуногенного воспаления. Идеальна для чувствительной кожи. Снижает дискомфорт, вызванный розацеа, экземой, атопическим дерматитом.

PALMITOYL TRIPEPTIDE-8

Регулирует иммунный ответ и защищает элементы внеклеточного матрикса (коллагеновые волокна, гиалуроновую кислоту и т. д.) от разрушения. Механизм противовоспалительного действия реализуется путем подавления секреции интерлейкина-8 и TNF-α.

NICOTINOYL TETRAPEPTIDE-7

Аналог Palmitoyl tetrapeptide-7, содержащий N-концевой остаток никотиновой кислоты. Тетрапептид-7 обладает противовоспалительным действием в результате уменьшения секреции интерлейкина-6 (IL-6). Стимулирует синтез ламинина IV и V, а также коллагена VII. Сокращает глубину и ширину морщин, улучшает упругость кожи.

Чувствительная — не значит беззащитная. Барьер снова на вашей стороне.

Восстанавливает барьерные функции кожи и помогает снизить реакцию на раздражители

Активные вещества

Palmitoyl Tripeptide-8

- защищает элементы внеклеточного матрикса (коллагеновые волокна, гиалуроновую кислоту и т. д.) от разрушения
- оказывает противовоспалительное действие
- подавляет секрецию интерлейкина-8 и TNF-α
- регулирует иммунный ответ

Nicotinoyl Tetrapeptide-7 (аналог Palmitoyl tetrapeptide-7)

- обладает противовоспалительным действием
- уменьшает секрецию интерлейкина-6 (IL-6)
- стимулирует синтез ламинина IV и V
- стимулирует синтез коллагена VII
- сокращает глубину и ширину морщин
- улучшает упругость кожи

Описание и состав

INCI
Palmitoyl Tripeptide-8
Nicotinoyl Tetrapeptide-7
Isopentyldiol

CAS No
936544-53-5
–
50468-22-9/2568-33-4

Внешний вид
Прозрачная (от бесцветной до светло-желтой) жидкость

Содержание пептидов (ppm)
≥ 200 (Palmitoyl Tripeptide-8)
≥ 200 (Nicotinoyl Tetrapeptide-7)

pH
6,5 ± 0,5

Рабочий интервал pH
5-7

Рекомендуемый % ввода
Ежедневный уход: 1-2 %
Интенсивный уход: 3-5 %

Режим ввода
Рекомендуется вводить при температуре ≤ 35 °C

Растворимость
Растворим в воде

Фундамент кожи — под защитой

Снижает реакцию кожи на раздражители, помогает поддерживать нормальный порог чувствительности

Косметический эффект

ингибирует активность гиалуронидазы	оказывает антиоксидантное действие	устраняет воспаления и покраснения
помогает поддерживать нормальный порог чувствительности кожи	снижает отечность и уменьшает количество расширенных сосудов	предотвращает распространение воспалительного процесса
успокаивает раздраженную кожу	улучшает упругость и эластичность кожи	улучшает текстуру и тон кожи
уменьшает выраженность морщин	снижает реакцию кожи на раздражители	улучшает цвет кожи

Рекомендуемые направления

- успокаивающие средства при атопическом дерматите, контактном дерматите, розацеа
- средства по уходу за чувствительной кожей
- уходовые средства после дерматологических процедур
- средства после депиляции и пилинга
- средства для загара и после загара
- дневной защитный уход
- средства после бритья

Всегда открыты для общения.

cytomed@proactive.ru

ЦИТОМЕД ProActive